



Avaunt®

NAERI-HIILAMARDIKAD VÕIVAD OLULISELT VÄHENDADA RAPSI SAAGIKUST. AVAUNT® KAITSEB EFFEKTIIVSELT RAPSI ÕIENUPPE NAERI-HIILAMARDIKATE EEST. UNIKAALNE TOIMEMEHHANISM ON TÕHUS KA PÜRETROIDIDE SUHTES RESISTENTSEKS MUUTUNUD HIILAMARDIKA POPULATSIOONIDE TÕRJEL. AVAUNT® AITAB KINDLUSTADA SINU RAPSIPÕLDUDE SAAGIKUST TÄNA JA HOMME.

TEHNILISED ANDMED

Kultuurid	Tali- ja suviraps, rüps
Kahjustajad	Naeri-hiilamardikas (<i>Meligethes aeneus</i>)
Toimeaine	Indoksakarb
Toimeaine sisaldus	150 g/l
Keemiline klass	Oksadiasiin (IRAC-i 22 rühm)
Kulunorm	0,2 l/ha
Registreerimise number	0429/10.02.2012
Kasutuskordade arv	1 kord hooajal




Indoksakarbiga kokkupuutel surevad naeri-hiilamardikad 1-4 päeva pärast. Kahjureid võib sel ajal veel liikumas näha, aga nad ei kahjusta enam kultuuri.

Indoksakarbil on pärast õienuppude pritsimist järelmõju 7-10 päeva, mistõttu saavad ka hiljem taimele tulnud naeri-hiilamardikad kahjustada ning lõpetavad söömine.

KAHJURITE TÕRJE SAAGI KINDLUSTAMISEKS

Täiskasvanud naeri-hiilamardikad on rapsile kõige ohtlikumad enne õitsemist. Nad toituvad rohelistest õienuppudest, vähendades õite arvukust ja seeläbi on kõtrade moodustumine häiritud.

Naeri-hiilamardika kahjustus rapsi õitel ja kõtradel




Indoksakarbi unikaalne toimemehhanism peatab naeri-hiilamardikate söömise minutitega. Avaunt® pritsimine enne õitsemist aitab kaitsta rapsi õienuppe kahjustuste eest ning kindlustada saagipotentsiaal.

KASUTAMISSOOVITUSED

Taimede parimaks kaitseks pritsige rohekate kuni kollakate õienuppude faasis, kui naeri-hiilamardika arvukus ületab majandusliku kahju künnise või tingimused/prognoosid on kahjurite levikut soodustavad.

Kasvufaas: BBCH 51-57




INSEKTITSIIDI AVAUNT® KASUTAMINE RAPSIL

- Peatab kiirelt naeri-hiilamardikate söömise
- Tagab kauakestva õienuppude kaitse
- Omab positiivset mõju saagikusele
- Omab minimaalne mõju kasuritele
- On tõhus integreeritud taimekaitse ning resistentsuse vältimise programmides

KIIRE LÕPP SÖÖMISELE JA KAUAKESTEV TOIME

Naeri-hiilamardikate kokkupuutel Avaunt®-ga pritsitud taimega lõpetavad putukad söömise minutitega. See on tingitud indoksakarbi unikaalsest toimemehhanismist. Putukad surevad 1-4 päeva jooksul.

Hea järelmõju kauakestvaks kaitseks



Selles uuringus ei olnud naeri-hiilamardikad resistentsed kasutatud püretroidi suhtes.

Indoksakarbil on pärast roheliste õienuppude pritsimist järelmõju 7-10 päeva, mistõttu saavad ka hiljem taimetele tulnud naeri-hiilamardikad kahjustada ning lõpetavad söömise.